

# SEVERIDAD EN OFTALMOPATIA TIROIDEA

<b>TEJIDOS BLANDOS</b>	<b>1. Edema palpebral o periorbitario</b> - Ausente - Leve: probable fluido subcutáneo o engrosamiento de la piel - Moderado: edema no a tensión - Severo: edema a tensión
	<b>2. Eritema palpebral</b> - Ausente - Presente: eritema pretarsal o preseptal
	<b>3. Enrojecimiento conjuntival</b> - Conjuntiva normal - Enrojecimiento moderado - Enrojecimiento severo
	<b>4. Edema conjuntival</b> - Ausente: - Presente: conjuntiva separada en más de 1/3 de la altura de la hendidura palpebral o que prolapsa por delante de línea gris
	<b>5. Inflamación de la carúncula o plica semilunar</b> - Ausente - Presente: prolapso de la plica inflamada a través de los párpados o inflamación de plica o carúncula
<b>POSICIÓN PALPEBRAL</b>	<b>6. Apertura palpebral</b> - Medida en mm de la hendidura palpebral del paciente en ppm y fijación lejana - Lagofthalmos presencia o ausencia
<b>EXOFTALMOS</b>	<b>7. Proptosis</b> - Medida con exoftalmometría Hertel
<b>MOTILIDAD OCULAR</b>	<b>8. Diplopia subjetiva</b> - 0: no diplopia - 1: diplopia intermitente - 2: diplopia inconstante - 3: diplopia constante en ppm
	<b>9. Afectación de la musculatura extraocular</b> - Ducciones musculares en grados, presencia de torticolis
<b>AFECTACIÓN CORNEAL</b>	<b>10. Defecto epitelial corneal</b> - 0: no - 1: queratopatía punteada - 2: úlcera corneal
<b>AFECTACIÓN DEL NERVIÓ ÓPTICO</b>	<b>11. Neuropatía óptica distiroidea</b> - 1: AV, test de Ishihara, DPAR, campo visual - 2: Valoración del disco óptico, normal atrofia - 3: pliegues coroideos si/no